



ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата Энтриколи

(организация-разработчик: ООО «Ветлайн», 142132, Московская область, г.о. Подольск, поселок Дубровицы, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, здание центра трансплантации эмбрионов, 1 этаж, пом. 10-16, 19-25, 27-31, 39-47, 49, 53)

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Энтриколи (Entrikoly);
международные непатентованные наименования: энрофлоксацин, триметоприм, колистин.
2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.
Энтриколи в 1 мл в качестве действующих веществ содержит энрофлоксацина – 100 мг, триметоприма – 50 мг, колистина сульфат – 2 000 000 МЕ, а также вспомогательные вещества – пропиленгликоль, молочную кислоту, бензиловый спирт, метабисульфит натрия, трилон Б, воду очищенную.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета. Допускается опалесценция.
Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.
Запрещается применение препарата Энтриколи по истечении срока годности.
4. Препарат выпускают расфасованным по 1 л в полимерные флаконы и по 5 л в полимерные канистры, укупоренные полимерными навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.
6. Энтриколи следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Энтриколи относится к комбинированным антибактериальным препаратам. Комбинация входящих в состав препарата активных компонентов обеспечивает широкий спектр его антибактериального действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.



10. Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов и обладает широким спектром антибактериального действия. Он подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bordetella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Clostridium spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, а также *Mycoplasma spp.* Резистентность бактерий к энрофлоксацину развивается относительно медленно, так как механизм его действия связан с ингибированием активности фермента ДНК-гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в бактериальной клетке, это препятствует размножению бактерий и их росту.

Энрофлоксацин хорошо и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает во все органы и ткани животных, выводится из организма преимущественно в неизмененном виде с мочой и желчью.

Триметоприм – бактериостатический антибиотик группы диаминопиримидинов. Он активен в отношении широкого диапазона микроорганизмов, в том числе грамположительных и грамотрицательных бактерий таких как: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, а также хламидий, нокардий (актиномицет), некоторых микобактерий и простейших. Механизм действия триметоприма связан с ингибированием бактериальной редуктазы дигидрофолиевой кислоты.

Триметоприм всасывается в желудочно-кишечном тракте быстро и почти полностью, проникает через плаценту и выделяется с молоком, выводится из организма в основном в неизмененном виде.

Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами *Bacillus polymyxa*. Обладает бактерицидным действием, блокирует фосфолипидные компоненты цитоплазматической мембраны, нарушая ее структуру и вызывая лизис бактерий. Проявляет выраженное бактерицидное действие в отношении грамотрицательных организмов, в том числе: *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Bordetella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*.

При пероральном введении колистина сульфат в желудочно-кишечном тракте взрослых животных практически не всасывается, однако у молодняка происходит частичная резорбция антибиотика. Колистина сульфат не подвергается воздействию пищеварительных ферментов и вследствие этого создается высокая концентрация антибиотика в кишечнике. Он не накапливается в органах и тканях, из организма выводится преимущественно с фекалиями.

Энтриколи по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Препарат применяют с лечебной целью сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, инфекционном синовите, бордетеллиозе, инфекционном рините, стафилококкозе; телятам при колибактериозе, сальмонеллезе, энтеритах. Препарат также назначают при других инфекционных



заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата или их комбинации.

12. Противопоказанием к применению препарата является гиперчувствительность животного к компонентам лекарственного препарата, выраженная печеночная и/или почечная недостаточность, заболевания центральной нервной системы и нарушения развития хрящевой и костной тканей. Запрещается применение препарата птице, чье яйцо используется в пищу людям.

13. При работе с препаратом Энтриколи следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Энтриколи. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Энтриколи не предназначен для применения беременным и лактирующим животным.

15. Препарат применяют перорально индивидуально или групповым способом с водой для поения или молоком (телята) в течение 3-5 дней в следующих суточных дозах:

- птице: 0,1 мл на 1 кг массы тела или 1 л препарата на 2000 л воды для поения;
- телятам: 0,2-0,4 мл на 10 кг массы тела один-два раза в день.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.

Приготовленный для использования раствор препарата Энтриколи можно хранить не более 24 часов.

При индивидуальном способе применения расчетное количество препарата разводят с водой или молоком (телята) в соотношении 1:1.

16. При применении препарата Энтриколи в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных и сельскохозяйственной птицы, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животных и птицы к компонентам препарата для ветеринарного применения и появлении аллергической реакции применение препарата прекращают и назначают антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке лекарственного препарата может наблюдаться нарушение функций желудочно-кишечного тракта.



ООО НПК «ФАРМИНДУСТРИЯ»
143960, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 7, литер В, пом. 9, этаж 3
Тел.: +7 (499) 553-10-21
www.pharmindustria.com / E-mail: info@pharmindustria.com

18. Не допускается одновременное применение препарата с нестероидными противовоспалительными средствами, антибиотиками группы макролидов, тетрациклинов.

19. Особенности действия при первом приеме препарата и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой телят на мясо разрешается не ранее чем через 15 суток, птицы – не ранее, чем через 12 суток после последнего применения препарата. Мясо птицы, вынужденно убитой до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Ветлайн», 142132,
Московская область, г.о. Подольск,
поселок Дубровицы, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ
им. Л.К. Эрнста, здание центра
трансплантации эмбрионов, 1 этаж, пом.
10-16, 19-25, 27-31, 39-47, 49, 53.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО НПК «Фарминдустрия», 143960,
Московская область, г. Реутов,
ул. Фабричная, дом 7, литер В, этаж 3,
помещение 9.
+ 7 (499) 553-10-21,
www.pharmindustria.com,
info@pharmindustria.com.

Генеральный директор
ООО НПК «Фарминдустрия»



В.В. Сафаров



**O'zbekiston Respublikasi
Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish
qo'mitasi huzuridagi Veterinariya dori vositalari,
ozuqabop qo'shimchalar sifati va muomalasi nazorati bo'yicha
Davlat ilmiy markazi**

RO'YHATGA Olish GUVOHNOMASI № 002895-25

Ushbu guvohnoma ООО НПК "ФАРМИНДУСТРИЯ"

Tadbirkolik sub'ekti nomi

Russian Federation

ga shu haqda berildiki, mahalliy va import qilinadigan veterinariya dori vositalari hamda ozuqabop qo'chimchalar ro'yhatdan o'tkazilganligi haqidagi guvohnomani berish to'g'risidagi nizomga muvofiq:

Энтриколи / Entrikoly

veterinariya dori vositasi yoki ozuqabop qo'shimchani nomi

ООО "Ветлайн", Russian Federation

Ishlab chiqaruvchi korxona va davlat

Og'iz orqali qo'llash uchun eritma

shaklida

Qishloq xo'jaligi parrandalarining kolibakterioz, salmonellyoz, mikoplazmoz, yuqumli sinovit, bordetellez, yuqumli rinit, stafilokokkoz; buzoqlarda esa — kolibakterioz, salmonellyoz, enteritlarda kasalliklarida qo'llash uchun dori vositasi

maqsadida qo'llash uchun

№ VP-002895-25 raqami bilan reestrda kiritildi

10.11.2025 da

5 yil muddatga

Ushbu guvohnoma mazkur veterinariya dori vositalari yoki ozuqabop qo'shimchalarni sotib olish uchun majburiyat, shuningdek, sifat sertifikatini hisoblanmaydi.

Direktor:



S.S.Oqqiyev

Guvohnomani qalbakilashtirish qonunga muvofiq ta'qib qilinadi