

23.07.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Полифлокс

(организация-разработчик: ООО НПК «Фарминдустрия», 143960, Московская область,
г. Реутов, ул. Фабричная, дом 7, литер В, этаж 3, помещение 9)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-12.26-5584 № ПЗР-3-Н.26/04201

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Полифлокс (Polyflox);
международные непатентованные наименования: энрофлоксацин, колистин.

2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.

Полифлокс в 1 мл в качестве действующих веществ содержит энрофлоксацин – 100 мг, колистина сульфат – 2 000 000 МЕ, а также вспомогательные вещества: молочную кислоту, бензиловый спирт и воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, допускается опалесценция.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 2 месяцев.

Запрещается применение препарата Полифлокс по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 1 л в полимерные флаконы и по 5 л в полимерные канистры, укупоренные полимерными навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Полифлокс следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: по рецепту ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Полифлокс относится к антибактериальным средствам группы фторхинолонов в комбинациях.

10. Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе

Haemophilus spp., *Klebsiella* spp., *Pasteurella* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Bordetella* spp., *Brucella* spp., *Chlamydia* spp., *Enterobacter* spp., *Campylobacter* spp., *Erysipelothrix* spp., *Corynebacterium* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Actinobacillus* spp., *Clostridium* spp., *Bacteroides* spp., *Fusobacterium* spp., а также в отношении *Mycoplasma* spp.

Механизм действия энрофлоксацина заключается в ингибировании активности фермента гиразы, оказывающего влияние на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки.

После перорального применения препарата энрофлоксацин хорошо и быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает в большинство органов и тканей организма, достигая максимальной концентрации в сыворотке крови через 1,5-2 часа. Терапевтические концентрации антибиотика сохраняются в организме в течение 24 часов. Энрофлоксацин частично метаболизируется в печени с образованием ципрофлоксацина и выводится из организма животных преимущественно с мочой, желчью и фекалиями.

Колистина сульфат – соединение группы полипептидных антибиотиков, обладает бактерицидным эффектом. Действие антибиотика заключается в его способности соединяться с фосфолипидами цитоплазматической мембраны бактериальной клетки, усиливая ее проницаемость, что ведет к разрушению клетки.

При пероральном введении колистина сульфат практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, таким образом создается высокая антибактериальная концентрация в кишечнике. Не накапливается в органах и тканях, из организма выводится преимущественно в неизменном виде с фекалиями.

Полифлоркс по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Препарат применяют сельскохозяйственной птице (ремонтному молодняку кур, цыплятам-бройлерам) с лечебной целью при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях, в том числе при колибактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, энтеритах, микоплазмозе и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину и колистину.

12. Противопоказанием к применению является гиперчувствительность животного к компонентам препарата, выраженная почечная и печеночная недостаточность. Запрещается применение лекарственного препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку птиц менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, ввиду накопления энрофлоксацина в яйце.

13. При работе с препаратом Полифлоркс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Полифлоркс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Полифлокс не предназначен для применения беременным и лактирующим животным.

15. Полифлокс применяют птице групповым способом с водой для поения в дозе 500-1000 мл препарата на 1000 л воды в течение 3-5 суток.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.

16. При применении препарата Полифлокс в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у птицы, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата для ветеринарного применения и появлении аллергической реакции применение препарата прекращают и назначают антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке лекарственного препарата может наблюдаться учащение дыхания и сердцебиения, а также наличие угнетенного состояния. В этом случае применение препарата следует прекратить и провести необходимую симптоматическую терапию.

18. Не допускается одновременное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), левомицетином, теофиллином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами, препаратами магния и кальция.

19. Особенности действия при первом приеме препарата и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток после последнего применения препарата. При вынужденном убое птиц ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Ветлайн», 142132,
Московская область, г.о. Подольск,
поселок Дубровицы, ФГБНУ ФИЦ
ВИЖ им. Л.К. Эрнста, здание центра
трансплантации эмбрионов, 1 этаж,
пом. 10-16, 19-25, 27-31, 39-47, 49, 53.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО НПК «Фарминдустрия», 143960,
Московская область, г. Реутов,
ул. Фабричная, дом 7, литер В, этаж 3,
помещение 9.
+ 7 (499) 553-10-21,
www.pharmindustria.com,
info@pharmindustria.com.

Генеральный директор
ООО НПК «Фарминдустрия»



В.В. Сафаров